VEG113387 (PROTECT)

Phase III

Nierenzellkarzinom adjuvant
Pazopanib vs. Placebo

Eine Phase III-Studie zur Untersuchung der Wirksamkeit und Sicherheit von Pazopanib als adjuvante Therapie bei Patienten mit lokalisiertem oder lokal fortgeschrittenem Nierenzellkarzinom nach einer Nephrektomie.

Studiennummer:

VEG113387

Design: Internationale, randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Studie der Phase III

Studienstart: Januar 2011

Studienleiter:

Prof. Dr. Chr. Doehn

Studienkoordination:

Martin Orlovius

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

Theresienhöhe 11

80339 München

Tel.: +49 (0) 89 360 44-8668

GlaxoSmithKline
Oncology

Studienablaufschema

Design

Vor der Randomisierung werden die Patienten stratifiziert nach

- Nephrektomie (partiell gegenüber radikal)
- TNM-Stadium

Endpunkte

Primärer Endpunkt:

Krankheitsfreies Überleben (DFS)

Sekundärer Endpunkt:

- Gesamtüberleben (OS)
- Sicherheit und Verträglichkeit
- Lebensqualität
- Biomarker

Haupteinschlusskriterien

- Patienten mit einem nicht metastasierten (M0) klarzelligem Nierenzellkarzinom mit einem der folgenden Stadien und nukleärem Grading nach Fuhrman:
 - pT2, G3 oder G4, N0 oder
 - pT3, G beliebig, N0 oder
 - pT4, G beliebig, N0 oder
 - pT beliebig, G beliebig, N1
- Bei dem Patienten wurde eine komplette makroskopische chirurgische Resektion des Tumors mittels partieller oder radikaler Nephrektomie durchgeführt.
- Karnofsky-Performancestatus (KPS) ≥ 80 .