

* Die OS-Daten wurden geschätzt unter Verwendung der Kaplan-Meier-Methode. Die OS-Raten nach 36 Monaten waren explorative Endpunkte. Die OS-Raten wurden formell nicht auf statistische Signifikanz getestet.²⁻⁴

1. Leitlinienprogramm Onkologie (Deutsche Krebsgesellschaft, Deutsche Krebshilfe, AWMF). S3-Leitlinie Diagnostik und Therapie des Hepatozellulären Karzinoms und biliärer Karzinome. Langversion 4.0 – August 2023, AWMF-Registernummer 032-053L. Erhältlich unter: https://www.leitlinienprogramm-onkologie.de/fileadmin/user_upload/Downloads/Leitlinien/HCC/Version_4/LL_Hepatozellul%C3%A4res_Karzinom_und_bili%C3%A4res_Karzinome_Langversion_4.0.pdf. Letzter Zugriff: April 2024.
2. Oh DY et al. Three-year survival and safety update from the Phase 3 TOPAZ-1 study of durvalumab plus chemotherapy in biliary tract cancer. Poster presented at: 11th Annual Cholangiocarcinoma Foundation Conference 2024, Salt Lake City, Utah, USA.
3. Oh DY et al. NEJM Evid 2022;1(8) (including Supplementary Appendix and Protocol).
4. Oh DY et al. ESMO-Kongress 2022, Poster #56P, Paris, Frankreich, Posterpräsentation.