

Fachinformation: Gaviscon Dual 250 mg / 106,5 mg / 187,5 mg Kautabletten. Stand: **Januar 2020**

Fachinformation: Gaviscon Dual 500 mg / 213 mg / 325 mg Suspension zum Einnehmen. Stand: **November 2020**

Fachinformation: Gaviscon Dual 500 mg / 213 mg / 325 mg Suspension zum Einnehmen im Beutel. Stand: **Dezember 2019**

Fachinformation: Gaviscon Liquid 500 mg / 267 mg / 160 mg Suspension zum Einnehmen. Stand: **Mai 2022**

Fachinformation: Gaviscon Advance Pfefferminz 1000 mg/200 mg Suspension zum Einnehmen im Beutel. Stand: **August 2021**

Basistext für Anzeigen in Fachkreisen

Gaviscon Dual

Gaviscon Liquid

Gaviscon Advance Pfefferminz

Zus.: *Dual 1 Kautbl.* enth.: Wirkst.: 250 mg Natriumalginat, 106,5 mg Natriumhydrogencarbonat u. 187,5 mg Calciumcarbonat. Sonst. Best: Macrogol 20 000, Mannitol (Ph.Eur.), Copovidon, Acesulfam-Kalium, Aspartam (E 951), Pfefferminzaroma, Azorubin (E 122), Magnesiumstearat (Ph.Eur.), Xylitol (enth. Carmellose-Natrium). *Dual 10 ml Susp.* enth.: Wirkst.: 500 mg Natriumalginat, 213 mg Natriumhydrogencarbonat, 325 mg Calciumcarbonat. Sonst. Best: Carbomer 974 P, Methyl-4-hydroxybenzoat (E 218), Propyl-4-hydroxybenzoat (E 216), Saccharin-Natrium, Pfefferminzaroma, Natriumhydroxid, ger. Wasser. *Liquid 10 ml Susp.* enth.: Wirkst.: 500 mg Natriumalginat, 267 mg Natriumhydrogencarbonat, 160 mg Calciumcarbonat. Sonst. Best: Carbomer 974 P, Methyl-4-hydroxybenzoat (E 218), Propyl-4-hydroxybenzoat (E 216), Saccharin-Natrium, Pfefferminzaroma, Natriumhydroxid, ger. Wasser. *Advance 10 ml Susp.* enth.: Wirkst.: 1 g Natriumalginat, 0,2 g Kaliumhydrogencarbonat. Sonst. Best.: Calciumcarbonat, Carbomer 974 P, Methyl-4-hydroxybenzoat (E218), Propyl-4-hydroxybenzoat (E 216), Saccharin-Natrium, Pfefferminz-Aroma (enth. Menthol), Natriumhydroxid, ger. Wasser. **Anw.:** Behandl. d. säurebed. Sympt. d. gastroösophag. Reflux w. Sodbrennen, saures Aufstoßen, Verdauungsstörungen (Dyspepsie) z.B. nach d. Mahlz., währ. d. Schwang. *Liquid u. Advance zusätzl.:* od. b. Pat. mit Sympt. in Zus.-hang m. e. Refluxösophagitis. **Gegenanz.:** Überempf. gg. d. Wirkst., Menthol od. e. d. sonst. Best. *Dual Kautbl. zusätzl.:* Überempf. gg. Azorubin. *Alle Susp. zusätzl.:* Überempf. gg. Methyl-4-hydroxybenzoat (E 218) u. Propyl-4-hydroxybenzoat (E 216). **NW.:** Sehr selt.: anaphylakt. od. anaphylaktoide Reakt., allerg. Reakt. wie Urtik., Überempf.-reakt. durch Menthol b. sensibilis. Pat. mögl. (einschl. Atemnot). *Alle Dual zusätzl.:* Sehr selt.: Bauchschm., Säure-Rebound, Durchfall, Übelk., Erbrechen; juckend. Hautausschlag. Nicht bek.: Alkalose, Hyperkalzämie, Milch-Alkali-Syndrom; respir. Effekte wie Bronchospasmus; Obstipation. *Dual Kautbl. zusätzl.:* allerg. Reakt. durch Azorubin mögl. *Liquid u. Advance zusätzl.:* Sehr selt.: respir. Effekte wie Bronchospasmus. *Alle Susp. zusätzl.:* Überempf.-reakt., auch Spätreakt., durch Methyl-4-hydroxybenzoat u. Propyl-4-hydroxybenzoat mögl. **Warnhinw.:** Hoher Natriumgehalt, enth. Menthol. *Alle Susp. zusätzl.:* Methyl-4-hydroxybenzoat (E 218), Propyl-4-hydroxybenzoat (E 216). *Dual Kautbl. zusätzl.:* Aspartam (E 951), Azorubin (E 122), Sucrose. *Advance zusätzl.:* enth. Kalium. Angaben gekürzt – Fachinformation beachten.

GAVD0074

Reckitt Benckiser Deutschland GmbH – 69067 Heidelberg