

25. September 2017

---

## R/R CLL: Verlängertes PFS durch Therapie mit Venetoclax + Rituximab

**In der MURANO-Studie, einer multizentrischen, offenen, randomisierten Phase III-Studie zu Venetoclax (VENCLYXTO®) in Kombination mit Rituximab, konnte der primäre Endpunkt eines verlängerten progressionsfreien Überlebens (PFS) im Vergleich zu Bendamustin in Kombination mit Rituximab bei Patienten mit rezidivierender/refraktärer chronischer lymphatischer Leukämie (R/R CLL) erreicht werden. Dem Behandlungsschema wurde in den USA bereits der Status als bahnbrechende Therapie (breakthrough therapy designation) zugesprochen.**

Eine unabhängige Expertenkommission hat die Studie geprüft und auf Grundlage der positiven Ergebnisse die Entblindung empfohlen. Die Daten zur Wirksamkeit und Sicherheit werden derzeit ausgewertet und auf einer kommenden medizinischen Fachkonferenz vorgestellt. Die Prüfarzte werden die Beobachtung der weiterhin an der MURANO-Studie teilnehmenden Patienten fortführen, um zusätzliche längerfristige Informationen zur Sicherheit und Wirksamkeit zu erhalten.

„Für Patienten mit chronischer lymphatischer Leukämie ist es wichtig, das volle Potenzial von VENCLYXTO® sowohl als Monotherapie als auch innerhalb einer Kombinationstherapie zu erforschen“, erklärt Michael Severino, M.D., Executive Vice President Research & Development und Chief Scientific Officer bei AbbVie. „Die Analyse der MURANO-Studie hat gezeigt, dass Venetoclax in Kombination mit Rituximab eine weitere Therapieoption für Menschen mit rezidivierender/refraktärer chronischer lymphatischer Leukämie darstellen könnte. Dabei ist besonders hervorzuheben, dass potenziell auf eine Chemo-Immuntherapie verzichtet werden kann.“

Quelle: AbbVie