

24. Januar 2019

---

## REFLECT-Studie: Nichtunterlegenheit für OS unter Lenvatinib gegenüber Sorafenib bei HCC-Patienten

**Eine Post-hoc-Analyse der Phase-III-Studie REFLECT (NCT01761266) hat für das Gesamtüberleben (OS) unter dem oralen Kinase-Inhibitor Lenvatinib gegenüber Sorafenib mit 22,4 Monaten bei Respondern und 11,4% bei Non-Respondern Nichtunterlegenheit gezeigt; die objektive Ansprechrate (OR=CR+PR) lag bei 24% vs. 9% (investigator review) bzw. 41% vs. 12% (independent review) unter Sorafenib. Zudem zeigte sich die OR als unabhängiger Prädiktor für das OS.**

Die hazard ratio für die Landmark-Analysen nach 2, 4 und 6 Monaten lagen für das mediane OS bei 0,75 (95%-KI: 0,57-0,98); 0,72 (95%-KI: 0,56-0,92) und 0,73 (95%-KI: 0,57-0,93).

Dabei zeigte sich die OR in der REFLECT-Studie als unabhängiger Faktor für das OS bei HCC-Patienten unabhängig von der Therapie.

*(übers. v. ab)*

Quelle: ASCO-GI

### Literatur:

[Kudo M et al. J Clin Oncol 37, 2019 \(suppl 4; abstr 186\)](#)