

## Signifikant längere Zeit bis zur Chemotherapie unter Enzalutamid

Die PREVAIL-Studie verglich den Androgenrezeptor-Signalweginhibitor Enzalutamid und Placebo bei 1.717 asymptomatischen bzw. mild symptomatischen Chemotherapie-naiven Männern, deren metastasiertes kastrationsresistentes Prostatakarzinom (mCRPC) unter einem LHRH-Analogen progredient war. Patienten unter Enzalutamid profitierten mit einer Risikoreduktion für radiographische Progression oder Tod (einer der co-primären Endpunkte) um 81% (HR=0,19; 95%-KI: 0,15-0,23;  $p<0,001$ ).

Die Auswertung sekundärer Endpunkte zeigte außerdem, dass sich mit Enzalutamid eine zytotoxische Chemotherapie um 17 Monate hinauszögern ließ: In der mit Enzalutamid therapierten Gruppe wurde die Chemotherapie im Median nach 28,0 Monaten initiiert vs. nach 10,8 Monaten unter Placebo (HR=0,35; 95%-KI: 0,30-0,40;  $p<0,001$ ). Darüber hinaus wies Enzalutamid ein gutes Verträglichkeitsprofil auf.

Quelle: Astellas

Literatur:

Beer TM et al., *N Engl J Med* 2014, 371(5):424-433